

Консультация эндокринолога от 29.10.14 г.: Первичный субклинический гипотериоз. Назначено: L – тироксин 50 $\frac{1}{4}$ 4 дня, затем $\frac{1}{2}$ таб-длительно. С 5.00-8.00, за 30 мин до еды, длительно. С 1.11.14 г. йодомарин 100 1 таб. * 1 раз, утром .С едой 2 мес.

Проводилось лечение:

- Режим 4/2, Диета №16б
- Энцефабол по 1,0 мл*2 раза в день № 11
- Мидокалм по $\frac{1}{4}$ таб*1 раз в день за 30 мин до массажа №10
- в/м церебролизин по 1,0 мл*1 раз в день №10
- массаж общий №10
- СМТ на нижние конечности в расслабляющем режиме №10
- Ингаляция с регидроном 3 раза № 10
- Биоптрон на лицо № 5.

На фоне проведенного лечения состояние ребенка улучшилось, улучшился мышечный тонус в нижних конечностях, улучшился упор на ножки периодически на полную стопу, с подгибанием пальчиков. Катаральные явления купированы. Выписывается с рекомендациями.

Рекомендации:

- Наблюдение педиатра, невролога, эндокринолога по месту жительства.
- Продолжить медикаментозную терапию: энцефабол по 2,5 мл*2 раза в день 1 месяц.
- По рекомендации эндокринолога L – тироксин 50 $\frac{1}{4}$ 4 дня, затем $\frac{1}{2}$ таб-длительно. С 5.00-8.00, за 30 мин до еды, длительно. С 1.11.14 г. йодомарин 100 1 таб. * 1 раз, утром с едой 2 мес. Явка на консультацию через 3-6 месяцев.
- Оформление инвалидности по месту жительства.
- Реабилитационное лечение в клиниках г.Астаны, г.Алматы.
- Повторить ИФА на ЦМВ, ТОХО через 2-3 недели, при нарастании титров антител консультация инфекциониста.
- ЛФК, массаж по месту жительства., *рекреативная гимнастика.*
- Прогулки на свежем воздухе.
- Беречь от простудных заболеваний, травм, перегрева.

Эпид. окружение чистое.

Леч. врач:

Зав. отд:

